



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **2 028 808** (13) **C1**  
(51) МПК<sup>6</sup> **A 61 K 35/78**

## (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: **93033655/14, 29.06.1993**

(46) Опубликовано: **20.02.1995**

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **Лекарственные растения, под ред. Гаммерман А.Ф., Минск, Наука и техника, 1967, с.325-326.**

(71) Заявитель(и):

**Бойко Игорь Александрович**

(72) Автор(ы):

**Бойко Игорь Александрович**

(73) Патентообладатель(ли):

**Бойко Игорь Александрович**

### (54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине и касается способа лечения рака. Цель изобретения - получение фитотерапевтического лекарственного средства, обладающего противоонкологической активностью для альтернативного лечения больных. Способ осуществляется следующим образом. Сначала принимают все лекарства из расчета на 10 кг массы больного спиртовую настойку шляпок мухомора красного, начиная с 1-2 кап с последующим увеличением дозы до 5-6 кап, после чего принимают спиртовую настойку корня аконита джунгарского по той же схеме, затем-

спиртовую настойку болиголова по той же схеме, а также до 0,01 сухого корня молочая Палласа, запивая 5-7 мл отвара, включающего иван-чай, омелу и чистотел, взятых в отношении 1:1:2, соответственно, затем 0,5-0,7 спиртовой настойки эхинацеи с увеличением дозы до 7 мл и отвара тысячелистника, водяного перца, полынь белую, взятых в отношении 2:1:1, затем - отвара корня бадана, зверобоя, шалфея, взятых в отношении 1:1:1, а также - 80%-ную спиртовую настойку прополиса, при этом прием указанных лекарственных средств производят курсом 1-4 раза в сутки, 1-6 мес, 1-2 раза в год. 12 з.п. ф-лы.

RU 2 0 2 8 8 0 8 C 1

RU 2 0 2 8 8 0 8 C 1



RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 028 808** <sup>(13)</sup> **C1**  
(51) Int. Cl.<sup>6</sup> **A 61 K 35/78**

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: **93033655/14, 29.06.1993**

(46) Date of publication: **20.02.1995**

(71) Applicant(s):

**Bojko Igor' Aleksandrovich**

(72) Inventor(s):

**Bojko Igor' Aleksandrovich**

(73) Proprietor(s):

**Bojko Igor' Aleksandrovich**

(54) **METHOD OF TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES**

(57) Abstract:

FIELD: medicine. SUBSTANCE: first of all the whole of drugs were taken (per 10 kg body weight of patient): spirituous tincture of fly agaric caps beginning from 1-2 drops following by dose increase up to 5-6 drops; then spirituous tincture of monkshood jungaricus root is taken by the same scheme and then - spirituous tincture of poison-hemlock by the same scheme, and also up to 0.01 g dry root of spurge Pallas. These tinctures were drunk with 5-7 ml decoction consisting of fire weed, mistletoe and celandine taken at the ratio 1:1:2, correspondingly; then spirituous

tincture of coneflower is taken (0.5-0.7 ml following by dose increase up to 7 ml) and milfoil, water pepper, white worm-wood decoction taken at the ratio 2:1:1; then - Bergenia pacifica root, Saint-Johns-wort, sage decoction taken at the ratio 1: 1: 1, and 80% spirituous tincture of propolis. Curative agents indicated were taken by course 1-4 times per 24 h for 1-6 months, 1-2 times per year. Proposed phytotherapeutic agent shows antitumor activity and can be used for alternative patient treatment. EFFECT: improved method of oncologic patient treatment. 13 cl

RU 2 0 2 8 8 0 8 C 1

RU 2 0 2 8 8 0 8 C 1

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения онкологических заболеваний с применением натуральных лекарственных средств.

Наиболее близким к предлагаемому является способ лечения онкологического заболевания, включающий прием комплекса лекарственных средств растительного происхождения, содержащего настойки плодовых тел мухомора красного и чаги и фитотерапевтических сборов, включающих чистотел и зверобой, а также сок свеклы.

При наличии определенных достоинств этот способ лечения не является универсальным для лечения различных разновидностей указанного заболевания.

Целью предложенного изобретения является повышение универсальности способа лечения онкологических заболеваний при использовании натуральных продуктов и фитотерапевтических средств.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе лечения онкологического заболевания сначала принимают спиртовую настойку шляпок мухомора красного, начиная с 750 мг с последующим увеличением дозы на 10-12%, после чего - по той же схеме и дозе спиртовую настойку корня аконита джунгарского, затем - спиртовую настойку болиголова, а также до 0,01 г сухого корня молочая Палласа, принимая по 50 мл отвала, включающего омелу и чистотел, взятых в отношении 1:2, соответственно, затем 5 мл спиртовой настойки эхинацеи с увеличением дозы до 12 мл и 50 мл отвара тысячелистника, водяного перца, полыни белой, взятых в отношении 2:1:1, затем - 50 мл отвала корня бадана, зверобоя, шалфея и Иван-чая, взятых в отношении 1:2:1:1, а также 750 мл 70-96%-ной спиртовой настойки прополиса, при этом прием указанных лекарственных средств производят курсом 1-4 раза в сутки 1,5-6 месяцев 1-2 раза в год.

Кроме того, настойку аконита запивают отваром чаги и/или медовой водой и/или соком или отваром калины.

Целесообразно в первый сбор дополнительно включить дымянку, барвинок малый, катарантус розовый, фиалку душистую, ромашку, пижму, одуванчик, мать-и-мачеху и/или сок чистотела.

Во второй добавляют по 0,8-1,2 мас.% календулы, вереска, череды, крапивы, пустырника и шиповника.

При этом настойку эхинацеи запивают отваром второго сбора с добавлением в него 2-3 мл 50%-ной спиртовой настойки маклюры с постепенным увеличением ее концентрации до 10-12 мл и/или 1 г корня ассофетиды (в порошке), после чего принимают 5-10 г настойки чеснока и/или настойки чаги.

При приготовлении отвара третьего сбора в него включают корень калгана и/или айра, растения таволги, репешок, гравилат, спорыш, подорожник в равных соотношениях, а также 10-15 мл сока подорожника и/или лукового состава.

При наличии боли у пациента после приема настойки эхинацеи принимают 40-80 мг 30-50%-ной спиртовой настойки белладонны, а также 1 г плодов расторопши в порошке, запивая их водой или настойкой чаги.

Кроме того, имеются иные дополнения или уточнения способа, изложенные ниже.

Ядро лечебного комплекса рекомендуется как средство для лечения различных видов злокачественных новообразований. Поэтому его составляют прежде всего растения и препараты, прочно зарекомендовавшие себя в практике различных фитотерапевтических систем, а также имеющие общую противоопухолевую активность (ПОА).

Каждое из этих сильнодействующих средств группирует вокруг себя ряд менее сильнодействующих растений, образуя вместе с ними подсистему, которая в процессе приема отделена паузой в 10 мин от другой системы, следующего сбора.

В начальной части комплекса представлен целый ряд растений, действующие вещества в которых - алкалоиды. Они предназначены для приема во временном интервале от растений, имеющих дубильные вещества. В самом конце комплекса принимается белладонна, нейтрализующая некоторые действующие вещества аконита и мухомора.

Одновременно в ядро входят растения, улучшающие и стимулирующие работу различных органов и систем человека. При этом предпочтение отдается прежде всего тем

из них, которые одновременно обладают и ПОА. Так, имея противоопухолевую активность, водяной перец играет роль также и мочегонного средства; полынь горькая - улучшение пищеварения, повышения аппетита; омела - улучшения сердечной деятельности, является антисклеротическим средством; спорыш - средство противовоспалительное и улучшающее работу легких; чистотел - желчегонное и т.д.

Настои и отвары для лечебного комплекса готовят следующим образом.

1-й сбор включает растения чистотела, дымянку, барвинок малый, катарантус розовый, омелу, фиалку душистую, ромашку, пижму, одуванчик, мать-и-мачеху.

2-й сбор включает тысячелистник, водяной перец, полынь белую, календулу, вереск, череду, крапиву, пустырник и плоды шиповника.

3-й сбор включает корень бадана, пиона, калгана, айра, лопуха и надземную часть зверобоя, репешка, гравилата, спорыша, шалфея, подорожника, иван-чая.

4-й сбор включает мяту, пустырник, крапиву, тысячелистник, зверобой, шалфей, календулу, подорожник, водяной перец и плоды шиповника.

В сборах 1,2,3 все растения берутся в равных массовых частях (по одной части), за исключением:

в сборе 1 трава чистотела берется в двух частях;

в сборе 2 трава тысячелистника берется в двух частях;

в сборе 3 трава зверобой берется в двух частях.

В сборе 4 все компоненты в равных частях.

Содержимое каждого сбора измельчается, перемешивается. Обычная дозировка:

полная столовая ложка (5-7 г) смеси на стакан кипятка, парить 10 мин на водяной бане,

затем дать остудиться, отстояться, процедить. В случае, если больной страдает от

переизбытка влаги, дозировки приема следует уменьшить до 30 г (стандарт 50-100 г), но

на стакан кипятка брать две полные столовые ложки смеси, греть на водяной бане 15 мин.

Хранить готовые отвары в стеклянной посуде в холодильнике не более трех дней. Перед употреблением все составы подогревать.

Для настойки мухомора берут только шляпки собранного в тот же день красного

мухомора и грубо (1-2 см) измельчают, заливают 30-70% спиртовым раствором в весовом

соотношении 1:1. Настаивается в стеклянной герметичной посуде в темном месте 40 дней.

Отжимают, фильтруют. Готовая настойка хранится в герметичной стеклянной посуде в темном прохладном месте.

Настойка аконита приготавливается из сухих корней аконита джунгарского. Корни

измельчают, заливают 30-60%-ным спиртовым раствором из расчета на 1 г порошка

аконита 20 г спиртового раствора 1:10/30. Настаивают 10 дней.

Настойка болиголова и белладонны приготавливается из сухой травы растений. Сырье

измельчают, заливают 30-60%-ным спиртовым раствором. На 1 г сырья 15 г раствора 1:

10/30. Настаивают 10 дней.

Чага на меду приготавливается из чаги, меда и свежих ягод калины, взятых в равных

массовых пропорциях. Если нет свежих ягод калины, можно воспользоваться сухими - их

следует взять в два раза меньше, т.е. 1/2 от массы чаги и меда, можно воспользоваться соком калины, который в равных количествах заменяет свежую калину.

а) Берут 300 г чаги, заливают тремя л кипяченой воды 1:10 размачивают 5 ч.

Измельчают чагу на терке, желательно неокисляющейся, заливают ее водой, в которой

размачивали и подогревают до 50-60°C. Затем закутывают теплым одеялом, оставляют настаиваться двое суток. Затем отжимают через марлю.

б) 300 г свежих ягод калины разминают, заливают одним л кипяченой воды

(соотношение примерно 1:3, 1:4 - в расчете на упаривание), парят на водяной бане или

малом огне, не доводя до кипения 1 ч. Остужают, отжимают через марлю. Смешивают с

настойкой чаги и добавляют мед.

в) 300 г меда тщательно перемешивают. Хранят в холодильнике при 3-6°C.

Во избежание закисания данный состав можно готовить в меньших количествах.

Например, 100 г чаги - литр воды, 100 г калины - 300-400 г воды, 100 г меда.

В случае, когда отвар заменяется настойкой чаги, приготовленной указанным способом (без добавления калины и меда) хранить ее даже в холодильнике можно не более 3 дней. Настойку чаги можно пить и наряду с отваром.

5     Настойка маклюры. Свежесорванные плоды маклюры целиком, не измельчая заливают 30-60% -ным спиртовым раствором в соотношении 1:1,5 - (на один кг плодов маклюры 1,5 кг спиртового раствора). Раствор должен слегка покрывать плоды. Настаивать 40 дней. Далее настойку можно использовать. Однако сливать ее не следует, ибо продолжают настаиваться более глубокие слои плодов.

10    Настойка эхинацеи. Сухое сырье. Корень или надземная часть эхинацеи измельчаются и заливаются 30-60%-ным раствором спирта. Соотношение 1:10. Настаивают 10 дней. Отфильтровывают. При этом настойка корня значительно эффективнее, чем настойка травы. Если свежее сырье, измельченное заливают 30-70%-ным раствором спирта. Соотношение 1:5. Настаивают 20 дней.

15    Чесночный состав приготавливается из долек чеснока, 30-60%-ного спиртового раствора и меда, взятых в равных количествах. Дольки чеснока, измельченные и протертые в неокисляющейся посуде неокисляющимся предметом заливают 30-60% -ным спиртовым раствором, настаивают 10 дней. Затем добавляют мед.

Луковый состав приготавливается аналогично чесночному, в тех же пропорциях, с теми же компонентами и последовательностью.

20    Прополис на меде. Прополис настоять на 96%-ном спирте в соотношении 1:4 в течение 40 дней. Отфильтровывают. Настойку прополиса смешивают с медом в соотношении 1:4.

Отвары для спринцеваний. Две столовых ложки измельченной травы кирказона заливают стаканом кипятка, парят на водяной бане или малом огне, не доводя до кипения 10 мин, закутав в теплое, настаивают 3 ч, процеживают. Аналогичным образом готовятся 25    отвары для спринцевания из чистотела, ромашки, календулы, подмаренника настоящего. В также отвары из смеси равных частей ромашки с календулой для промываний перед спринцеваниями.

Лечение проводили по следующей схеме.

30    Настойка мухомора запивается глотком воды или капается в столовую ложку воды и выпивается с ней.

Для взрослого человека прием начинается с в 250 мг (10 капель), и увеличиваясь каждый прием на 25-30 мг (одну каплю), доводится до 50 капель (максимум до 150 капель под наблюдением врача).

Для детей дозировки уменьшаются соразмерно возрасту и весу.

35    Интервалы между приемами 10 мин.

Настойка аконита запивается настойкой чаги. В ложку капается 15 капель настойки аконита и запивается 50 г настойки чаги. В связи с большой токсичностью действующих 40    веществ аконита, увеличивать дозировку его настойки можно лишь под наблюдением врача, ежедневно прибавляя по одной капле. Но не доводить разовый прием более чем до 30 капель (максимум 60). Дозировка настойки чаги может быть увеличена до 100-150 г. Лишь бы не создавалось переизбытка жидкости в организме.

В 50 г отвара, полученного из сбора 1, влить одну чайную ложку сока чистотела.

Накапать 15 капель настойки болиголова, взять порошок молочая Паллача на кончике ножа (примерно 0,05 г), запить их отваром.

45    Прибавляя каждый прием по одной капле, довести разовую дозу настойки болиголова до 30 капель (максимум 70). Точно так же увеличивается доза молочая Палласа (примерно до 0,1), который обладает, кроме прочего и слабительным действием. Поэтому первым индикатором его передозировки (при условии его приема в порошке) является расстройство желудка. Однако следует помнить, что действующие вещества мухомора, 50    аконита, болиголова и молочай Палласа растения ядовитые. Менее ядовит, но тоже весьма опасен сок чистотела. Поэтому со всеми перечисленными препаратами следует обращаться осторожно, соблюдая дозировку.

В 50 г отвара, полученного из сбора 2 добавить 15 капель настойки маклюры. Запить

им чайную ложку настойки эхинацеи и порошок корня ассафетиды (примерно 1 г).

Прибавляя каждый прием по одной капле, довести разовую дозу настойки маклюры до 50 капель. Настойку эхинацеи можно увеличивать до столовой ложки.

После краткой паузы в несколько секунд выпить 1/2 чайной ложки чесночного состава, запить его произвольно настойкой чаги.

Постепенно количество чесночного состава, принимаемого за один раз увеличивать до целой ложки.

В 50 г отвара, полученного из сбора 3, добавить столовую ложку сока подорожника. Запить ими 5 капель настойки белладонны и чайную ложку порошка плодов расторопши.

Настойка белладонны употребляется лишь при наличии у пациента болей, если же они отсутствуют, эта настойка исключается из данного состава.

Напротив, если боли сильны и не снимаются данной дозировкой, возможно ее увеличение до 25 и 30 капель, а также внеочередное (вне комплекса) повторение приема одной настойки белладонны, которая в этом случае запивается водой или настойкой чаги.

После краткой паузы выпить одну чайную ложку лукового состава, запив его чагой.

После краткой паузы съесть одну чайную ложку прополиса на меду, не запивая.

Далее выпить 100 г сока, приготовленного из свежей свеклы. Если больной плохо переносит густой сок, его можно разбавить, если же переносимость нормальная, желательно пить неразбавленный и довести дневное потребление сока до 800-1000 г.

Указанный комплекс принимается четыре раза в день: утром, перед сном и два раза среди дня через, примерно, равные промежутки времени, за полчаса до еды (кроме последнего приема на ночь).

Отвал, приготавливаемый из сбора 4, следует пить не по расписанию вместе с комплексом, а произвольно вместо воды, молока, чая и т.д. - для утоления жажды - и в произвольных количествах.

При лечении различных онкологических заболеваний в комплекс вводятся специфические дополнения.

При раке легких во второй сбор добавляется по одной части корня окопника, медуницы, мать-и-мачехи. В третий сбор добавляется еще одна часть корня окопника. Вместо сбора 4 назначается настойка чаги (без меда и калины).

При раке желудка в сбор 2 добавить по одной части корень цикория и полынь обыкновенную (чернобыльник). В сборе 3 увеличить до 2-х частей корень аира. Вместо сбора 4 - настойка чаги. В сборе 3 увеличить также до двух частей корень лопуха, добавить туда же одну часть водяного перца.

При раке матки в сбор 1 добавить одну часть спорыньи, в сбор 2 одну часть ромашки, в сборе 3 увеличить до двух частей корень пиона, туда же добавить одну часть подмаренника настоящего.

При раке матки, эрозии шейки матки делаются также спринцевания из отваров: травы кирказона, чистотела, подмаренника настоящего, ромашки и календулы. Возможен также спринцевальный сбор из всех перечисленных компонентов. В спринцеваниях трава чистотела может заменяться соком, который в этих случаях даже эффективнее. Обычно наиболее сильно действует спринцевание из кирказона. Спринцевания делать с задержанием на 30 мин.

При раке губы, кожи, молочной железы (если опухоль близко к поверхности) компрессы из настойки мухомора, сока чистотела, сока свежей красной свеклы. Эти компрессы следует чередовать, делая каждый не менее месяца подряд, не смешивая с другими, подбирая тем самым наиболее эффективный для данного случая. Причем, если компрессы из настойки мухомора и сока чистотела можно делать на всю ночь или весь день, то компрессы из сока свеклы необходимо менять пять - шесть раз в день. При этом компрессы не должны быть согревающими. Наиболее сильнодействующей обычно является настойка мухомора.

При раке печени в сбор 2 добавляются по одной части кукурузные рыльца и бессмертник.

При лейкозах в сбор 2 добавить две части медуницы. Кроме прополиса на меду принимать настойку прополиса на спирту. Приготовление настойки указано в соответствующем разделе.

5 Настойку капать в ложку воды, начиная с 30 капель, доводя до 50, прибавляя по одной капле каждый прием. Запивать отваром 2.

При раке горла в сбор 2 добавить две части земляничного листа.

При раке предстательной железы, аденоме предстательной железы в сбор 2 добавить две части лещины (листа лесного ореха). Со сбором 3 принимать по столовой ложке настойку лещины (лист лесного ореха), которая приготавливается следующим образом.  
10 Лист лесного ореха (живой или сухой) измельчить, залить 30-60% -ным раствором спирта 1:5, настоять 10 дней в темном месте, ежедневно встряхивая.

При раке мочевого пузыря во внутрь - до 10 мг корень подофила щитовидного (в сухом виде) и 1 г корня на 200 мл воды кипяченой, нагревать 15 мин на водяной бане с отваром 1 и вводят через катетер в мочевой пузырь по 50-100 мл 1-3 раза в неделю.

15 При мастопатии. Пить весь комплекс без увеличения дозировок настоек. Т. к. аконит, болиголов, мухомор принимать только по 15 капель. Поскольку в данном случае человек практически здоров и ведет социально активный образ жизни, достаточно приема комплекса не четыре, а два раза в день - утром и вечером. В крайнем случае один раз в день.

20 Однако при этом необходимо добавить настойку внутренних перепонок (перегородок) грецких орехов. Перепонки грецких орехов грубо измельчить, залить 30-60%-ным спиртовым раствором в массовом соотношении 1:5, настоять 10 дней в темном месте, ежедневно встряхивая. Настой отфильтровать. Оставшийся жмых залить кипяченой водой в соотношении 1:10 (имеется в виду первоначальный вес сухих перепонок). Спиртовую  
25 настойку принимать по десертной ложке (постепенно доводя до столовой), запивая отваром 3. Вне комплекса, отдельно принимать ее за час до еды, не запивая. Через 10 мин после нее выпить глоток водного настоя перепонок (50 г).

30 В случае, если страдающие мастопатией, миомой имеют наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям, им необходимо не менее двух раз в год выпивать полный общий комплекс, рассчитанный на месяц.

Та же профилактическая мера рекомендуется всем людям онкологической группы риска, прежде всего тем из них, у кого в родне есть больные раком.

Некоторые онкологические заболевания, например, связанные с гинекологией, как известно, сопровождаются кровотечениями. Сочетание в комплексе таких составляющих,  
35 как водяной перец, бадан, спорыш, крапива, тысячелистник обеспечивают кровоостанавливающий эффект в большей степени, нежели их простая сумма. В редких случаях, когда это оказывается недостаточно, в сбор 1 добавить одну часть спорыньи, а в сбор 3 - одну часть корня кровохлебки. Или же увеличить вдвое количество бадана и тысячелистника в соответствующих сборах.

40 То же самое касается утоления болей. Как известно, 70% онкологических больных испытывают боли. Для снятия болей используются как сильнодействующие средства, специально для этого предназначенные, например, белладонна, так и растения, обезболивающая функция которых не является основной. Это болиголов, полынь белая, чага, тысячелистник, водяной перец. Однако в сочетании с остальными компонентами  
45 комплекса они дают значительно больший болеутоляющий эффект, нежели можно было ожидать от их простой суммы. Некоторые раковые больные, испытывающие сильные боли, не обходившиеся без применения наркотических средств, начав принимать комплекс, полностью от них отказывались. степени, нежели их простая сумма. В редких случаях, когда этого оказывается недостаточно, в сбор 1 добавить одну часть спорыньи, а в сбор  
50 3 - одну часть корня кровохлебки. Или же увеличить вдвое количество бадана и тысячелистника в соответствующих сборах.

То же самое касается утоления болей. Как известно, 70% онкологических больных испытывают боли. Для снятия болей используются как сильнодействующие средства,

специально для этого предназначенные, например, белладонна, так и растения, обезболивающая функция которых не является основной. Это болиголов, полынь белая, чага, тысячелистник, водяной перец. Однако в сочетании с остальными компонентами комплекса они дают значительно больший болеутоляющий эффект, нежели можно было  
5 ожидать от их простой суммы. Некоторые раковые больные, испытывающие сильные боли, не обходившиеся без применения наркотических средств, начав принимать комплекс, полностью от них отказывались.

Нет надобности говорить о том психическом напряжении, которое свойственно онкологическому больному, осознающему свое положение. Повышенная  
10 раздражительность, подавленность, склонность к стрессам - все это обычные характерные явления, сопровождающие данное заболевание, в то же время эти явления мощный стимулятор раздражительного процесса, развития болезни. При небольшом количестве компонентов, из числа тех, которые используются в официальной медицине как седативные средства (мята перечная, пустырник) комплекс в целом оказывает большое  
15 успокоительное действие. Через месяц после начала приема рекомендованных средств у большинства больных отмечается стабилизация психики, общая уравновешенность. Хотя психическое состояние больного, лечащегося по этой системе, формируется не только под влиянием рекомендуемых составов, но и в результате саморегуляции.

Неудовлетворительная работа желудочно-кишечного тракта может быть связанной с  
20 основным заболеванием или иметь иные причины. Поскольку чрезвычайно важно, чтобы у больного был ежедневный нормальный стул, на случай запоров предлагаются различные меры.

При кратковременном однодневном запоре - клизма отвара ромашки. 4 столовых ложки ромашки залить литром кипятка, парить на водяной бане или малом огне, не доводя до  
25 кипения 10 мин. Остудить, процедить.

При частых, периодических и хронических запорах добавить в сбор 3 одну часть жостера, а если этого окажется недостаточно, добавить туда же одну часть крушины или сенны. Однако эти последние средства следует применять лишь в крайности, если по  
30 каким-либо причинам нельзя воспользоваться внутренними резервами предлагаемых составов. Ибо на этот случай в ядре комплекса заложен собственный уникальный регулятор - молочай Палласа. Его свойства многообразны. Так наряду с ПОА он обладает и сильным слабительным действием. Регулируя дозировку порошка молочая Палласа, взятого на кончине ножа, регулируется нормальная работа желудка. Причем резкое расстройство желудка - показатель передозировки.

35 Диета предполагает прежде всего ограничения, отказ от каких-либо видов пищи, а именно: следует полностью исключить из рациона мясо, рыбную икру, копчености, консервы, кофе, острые приправы вроде перца, горчицы, алкогольные напитки, курение и т.д.

Такого рода диета достаточна в случаях более легких заболеваний. Максимально  
40 наполнить свой рацион продуктами, способствующими борьбе организма с болезнью. Побольше употреблять в пищу эти продукты: чеснок, лук, красную свеклу - но только в свежем виде, - варенье они теряют свою эффективность. При употреблении лука и чеснока нужны некоторые предосторожности: следить за тем, чтобы не раздражался желудок, не появлялись характерные боли гастрита или язвы желудка. Сок свежей красной свеклы  
45 можно выпивать более литра за день или съесть такое же количество свежей тертой свеклы. Это следует делать, если организм нормально переносит красную свеклу.

Столь же обязательно употребление в пищу свежей моркови и капусты. Лучше всего их есть также, измельчив на терке, или пить отжатый сок. Из острых овощных продуктов  
50 полезны хрен и редька. В летнее время очень полезны салаты из молодых побегов одуванчиков, медуницы, гравилата городского. Можно их добавлять и в салаты из привычных, особенно перечисленных овощей, в супы после их готовности, чтобы уже не кипятить. При этом свежая медуница особенно полезна при лейкозах. Из ягод особенно хороши черника, земляника, черная смородина - свежие летом и протертые с сахаром -



зимой. Полезны также красный виноград и красное виноградное вино. Вместо чая, в дополнение к жидкостям, рекомендованным в основном комплексе, настой шиповника, который заливают кипятком с вечера в термосе, оставляя настаиваться на всю ночь. Сырые овощи, травы, ягоды, соки, салаты сдабривают подсолнечным маслом, соком лимона, хреном. Если организм не переносит какой-либо из рекомендованных продуктов, например, чеснок, - его следует исключить из рациона, но компенсировать увеличением потребления других рекомендованных овощей, например, лука, моркови и т.д.

Далее идут каши, особенно рисовая и овсяная, приправленные растительным маслом (масло сливочное следует исключить или предельно ограничить в употреблении).

Супы из круп и овощей. Мучные, макаронные изделия.

Хлеб лучше диетический, бездрожжевой.

Разнообразная молочная пища.

При лечении онкологических заболеваний также удаляют внимание дыханию и саморегуляции.

Дыхательными упражнениями нормализуется не только газообмен и терморегуляция. Вместе с другими упражнениями они восстанавливают такой важнейший фактор, как чувство жизненного ритма.

При онкологическом заболевании человек открыт беспокойству, неудовлетворенности, раздражению, злобе, страху и другим отрицательным эмоциям. В этом случае он бессилён противостоять стрессам, столь губительным, провоцирующим, а затем стимулирующим онкологические заболевания. Лишь возвращение к себе путем саморегуляции даёт равновесие духа. И только в этом состоянии человек способен к дальнейшей саморегуляции, противостоянию стрессам и от этого зависит эффект лечения. Так, пациент, регулярно пребывающий в стрессовом соотношении, способен тем самым свести на нет все объективные целительные усилия.

Больному рекомендуется выполнение дыхательного упражнения на свежем воздухе. Перед упражнением расслабиться, освободиться от дурных мыслей и эмоций. Чуть раздвинуть уголки губ как бы в легкой улыбке. Дышать только носом без излишнего напряжения.

Лучше всего принять положение лежа на спине, руки вдоль туловища, глаза закрыты - можно в постели без подушки. Но если обстоятельства не позволяют, можно это делать сидя или стоя, выпрямив спину, расправив плечи, чуть приподняв подбородок. Делаете вдох на четыре счета (примерно 4 секунды), сначала выпячивая шарообразно живот, заполняете нижнюю часть легких, затем чуть приподнимая и раздвигая грудную клетку, заполняете воздухом среднюю часть легких, и, наконец, слегка приподнимая плечи и подбородок, заполняете верхушки легких. При этом доля воздуха перекачивается из нижних частей легких в средние и верхушки. Плавное движение вдоха напоминает перекачивающуюся волну. Затем на четыре счета задерживаем дыхание. Третья фаза - выдох. Волнообразное медленное движение на четыре счета. Воздух выходит в той же последовательности, что и входил: подтягивается живот - освобождаются нижние доли легких. Чуть сужается и опускается грудная клетка - воздух выходит из средней части. Наконец, слегка опускаются плечи - освобождаются верхушки легких. Незначительное усилие мышц, которое потребовал вдох, должно смениться на этапе выдоха полной расслабленностью. Шейные позвонки и мышцы должны отпустить голову, занять положение под воздействием ее естественной силы тяжести. Следует сделать установку, что тело от макушки до кончиков пальцев, обмякнув, как бы растекается в ложе (как утренняя роса в долине). В этом состоянии следует переходить и находиться в четвертой фазе - задержки дыхания, отдых - тоже на четыре счета. Далее следует новый вдох и цикл повторяется.

Это упражнение следует делать не менее 20 мин (максимальная продолжительность неограничена) три - четыре раза в день. Если больной будет выполнять его регулярно и правильно, то он сумеет хорошо расслабиться и найти в нем отдых. Поэтому скоро оно будет доставлять удовольствие и освежать.

Со временем можно увеличивать продолжительность фаз дыхания до пяти, шести и более счетов (секунд).

Целесообразно в процессе дыхания медленно повторять, внушать себе лечебные слова, положительно влияющие на саморегуляцию:

5 Растения Вселенной распускаются во мне, вытесняя болезнь.

Глоток за глотком, день ото дня.

Я исцеляюсь. Я исцеляюсь.

Желательно внушить больному: постарайтесь дополнительно представить, увидеть то, что говорится в этой фразе.

10 Делать это следует без излишнего напряжения. Избранное дыхание освежает и расслабляет его тело и через него - мысли и дух. Избранные слова и возникающая с их помощью картина помогают ему и его телу.

Через некоторое время будет достаточно первой фразы, чтобы сквозь нее он увидит остальное, как сквозь открытую дверь. Наконец, он может перестать повторять слова -

15 если они и так уже стоят перед взором, словно цветы, деревья, солнце, которое видишь, даже если не смотреть на него прямо. Тело, дух - единый вселенский сад, в нем распускающиеся растения, безбрежье целебного воздуха и света одолевают больное и уродливое и скоро не оставят его следа.

В дальнейшем, каждый раз первые 10-15 дыханий надо делать со счетом. Очень хорошо  
20 выполнять его в промежутке между лечением и лечебным питанием. Но не делать его на полный желудок. В целом оно должно повторяться не менее четырех раз в день. Обязательно после пробуждения. И перед сном - желательно, лежа в постели, после него засыпая.

П р и м е р 1. 21.11.92 больная А. 1922 года рождения обратилась за консультацией  
25 по поводу рака ректогмоидального отдела 2-й и 3-й степени. 26.10.92 проведена операция с выведением толстого кишечника на переднюю брюшную стенку.

В анамнезе: много лет болела, предполагали грыжу. Но после поездки на юг, повторный приступ непроходимости кишечника, рвота, позывы на стул с отсутствием акта  
30 дефекализа. В феврале 1992 года произведено удаление опухоли с резекцией сигмоидального отдела кишечника. Обнаружены метастазы в печень. Химотерапию не принимала. Общее состояние было средней тяжести. Жалобы на растущую слабость, тошноту, головокружение, затрудненный стул. Кожа лица приобрела желтый цвет. Больная теряла в весе, практически перестала выходить из дома.

Больная после консультации стала принимать настоящий фитотерапевтический  
35 онкокомплекс. С 7.02.93 начала второй курс с добавлением расторопши. У больной нормализовался стул, улучшилось общее состояние, исчезла желтушность кожи лица. Больная прибавила в весе. В периоды перерывов в приеме фитотерапевтического онкокомплекса отмечается ухудшение общего самочувствия, затрудненный стул.

В настоящее время (на июнь 1993 г.) больная чувствует себя (объективно) вполне  
40 удовлетворительно: поправляется, ездит на дачу, выполняет посильную работу.

П р и м е р 2. Больной Х. Год рождения 1915. Обратился за врачебной помощью в центр "Живица" 24.07.92 с жалобами на боли в животе, тошноту, слабость. У больного год  
назад обнаружен рак селезеночного угла толстого кишечника с метастазами в печень. Год назад была сделана паллиативная операция с наложением колостомы.

45 В анамнезе: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит.

Объективно: состояние средней тяжести, пониженного питания, правильного телосложения. А/Д 110/70 мм рт.ст. Тоны сердца ритмичные, пульс 74 в 1 мин. В легких  
ослабленное дыхание. На передней брюшной стенке слева колостома.

После пяти курсов (по одному месяцу с двухнедельными перерывами)  
50 фитотерапевтического лечения по настоящей системе состояние больного улучшилось. Он стал более активным, стал выходить из дома, прибавил в весе 5 кг, исчезли боли в животе, исчезла желтушность кожи лица.

П р и м е р 3. Больной Ш. 1921 года рождения обратился 10.07.92 по поводу бластомы

главного бронха левого легкого, обнаруженной в январе 1992 года. Весной 1992 года у больного отмечалась выраженная слабость, быстрая утомляемость, потеря веса. Понижение гемоглобина, РОЭ/56. Кашель, одышка.

5 4.08.92 после курса фитотерапии (онкокомплекса) по настоящей системе у больного положительная динамика. Улучшилось субъективное самочувствие, больной окреп, уменьшились кашель, одышка. Стабилизировался вес. Больному рекомендовано продолжать курс лечения с добавлением элеутерококка, а также элементов овощной диеты: свекла, морковь, редька.

10 В конце октября 1992 года состояние больного по основному заболеванию стабилизировалось. Одышки нет, хотя периодически возникает влажный кашель. РОЭ-18, гемоглобин в норме. Консилиум врачей по месту обследования и наблюдения больного констатировал общее улучшение состояния здоровья. Однако хирург предлагает операцию. Впоследствии от операции пришлось отказаться в связи с неудовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы больного.

15 Рекомендовано продолжать курс лечения с увеличением дозировки онкологических капель. Также добавлена рябина, шиповник, Melissa, мята перечная.

П р и м е р 4. Больной Б. страдал в течение двух последних лет язвенной болезнью желудка. Лечился амбулаторно. В семье у матери и отца был рак желудка. В 1992 г. 20 больной бы обследован госпитализирован. В стационаре выявлен рак желудка с метастазами и поджелудочную железу. В марте 1992 года проведена пробная лапоротомия, затем один курс химиотерапии. После выписки из стационара состояние больного продолжало ухудшаться: похудел, появились боли в животе.

В июле 1992 года начал лечение описываемым онкокомплексом. В октябре, со слов 25 дочери, приехавшей на консультацию, отмечалось значительное улучшение в состоянии больного: больной стал набирать в весе, болей не ощущал, стал вести нормальный образ жизни. Лечение фитотерапевтическим комплексом продолжал. 25 ноября 1992 года 30 больной сам приехал с дочерью на консультацию и осмотр. Состояние вполне удовлетворительное, нормальное телосложение, каждые покровы розовые. При осмотре увеличения периферических лимфоузлов не отмечалось. Отмечалось увеличение левой 30 доли печени - выступала из-под реберного края на 1,5 см. Жалоб при осмотре не предъявлял. Боли в животе беспокоили изредка, проходили самостоятельно. Аппетит хороший. Рекомендовано продолжать прием онкокомплекса, пройти затем обследование.

28 апреля 1993 года приехала дочь больного с результатами обследования, проведенного в марте 1993 года. Со слов дочери больной чувствует себя нормально. 35 Работает на участке, ведет обычный образ жизни. Аппетит хороший. Болей нигде не ощущает.

Результаты обследования. УЗИ от 24.03.93.

Печень не увеличена в размерах. Контур печени ровный, четкий. Паренхима печени 40 обычной структуры. Селезенка не увеличена. Желчный пузырь шаровидной формы. Стенка желчного пузыря очагового умеренно утолщена. Желчный пузырь содержит акустически прозрачную желчь.

Поджелудочная железа не визуализируется в полном объеме из-за высокого стояния желудка и кишечника с газами.

Почки обычной формы, нормальных размеров, правильного положения. Чашечно- 45 лоханочная система почек не расширена. Ан.крови от 22.03.93. Нв - 148 г/л. СОЭ - 7 мм/ч.

Заключение: имеются явления хронического холецистита. Больному рекомендовано 50 продолжать курс фитотерапевтического лечения по данному онкокомплексу с добавлением в сборы корня аира и корня лопуха большого, травы полыни белой. Добавлен прием прополиса.

50 Данный лечебный комплекс выгодно отличается от известных тем, что для онкологических заболеваний по существу является универсальным. Однако он дополняется (кроме основного набора лекарственных средств) специфическими компонентами для лечения рака легких, желудка, матки, печени, губы и кожи, мочевого

пузыря.

При комплексном лечении активизируются защитные силы организма, его сопротивляемость как за счет улучшения работы органов и систем человека, так и направленного воздействия на очаг поражения.

5 Накоплен положительный опыт получения лекарственных средств, их хранения, повышения адаптации организма в случае индивидуальной плохой переносимости к некоторым из их компонентов, выявлены симптомы возможных высоких доз этих средств, а также - изменения соотношений ингредиентов для одновременного лечения побочных заболеваний человека.

10 В разработке обобщена оригинальная методика использования ранее неизвестных сочетаний различных групп натуральных средств, дополняющих друг друга и наиболее положительно влияющих на организм человека при различных онкологических заболеваниях.

15 Настоящий способ апробирован в Российской Федерации с получением устойчивых положительных результатов лечения.

#### Формула изобретения

1. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, включающий прием спиртовой настойки мухомора красного, отличающийся тем, что прием настойки мухомора  
20 начинают с дозы 750 мг и увеличивают ее в каждый последующий прием на 10 - 12%, дополнительно начинают прием 40 - 60%-ной спиртовой настойки корня аконита джунгарского в дозе 750 мг и увеличивают ее на 7-10% ежедневно, затем через 5-15 мин принимают 30 - 50%-ную спиртовую настойку травы болиголова пятнистого в дозе 750 мг и увеличивают ее на 7-10% в каждый последующий прием, далее - сухой корень молочая  
25 Палласа в дозе 0,04 - 0,1 и запивают его 50 мл отвара первого сбора, включающего траву омелы белой и траву чистотела большого при соотношении компонентов 1:2, после чего принимают 30-50%-ную спиртовую настойку эхинацеи в дозе 5 мл с последующим увеличением дозы до 12 мл, а также принимают 50 мл отвара второго сбора, включающего траву тысячелистника обыкновенного, траву водяного перца, траву полыни белой при  
30 соотношении компонентов 2: 1: 1, далее 50 мл отвара третьего сбора, включающего корень бадана толстолистного, траву зверобоя продырявленного, траву шалфея лекарственного и траву Иван-чая при соотношении компонентов 1:2:1:1, затем принимают 750 мг 70-96%-ной спиртовой настойки прополиса, курс лечения проводят 1 - 4 раза в сутки, в течение 1,5 - 6 месяцев, 2 раза в год.

35 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что настойку корня аконита джунгарского запивают отваром чаги и/или медовой водой и/или соком или отваром плодов калины обыкновенной.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что после приема эхинацеи назначают 30 - 50%-ную спиртовую настойку плодов маклюры оранжевой в дозе 2 - 3 мл с последующим  
40 увеличением дозы до 10 - 12 мл и/или 1 г порошка корня асафетиды, далее 5 - 10 г 30 - 50%-ной спиртовой настойки чеснока и/или отвара чаги.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после приема прополиса принимают 2,5 - 4 г лукового настоя и запивают настойкой чаги.

45 5. Способ по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что после приема прополиса принимают 100 - 200 мл свежего сока красной свеклы.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака легких в отвар второго сбора добавляют корень окопника жесткого, траву медуницы, лист мать-и-мачехи по 1 вес.ч.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака желудка в отвар второго  
50 сбора добавляют корень цикория и траву полыни обыкновенной по 1 вес. ч. , в отвар третьего сбора добавляют корень аира болотного, корень лопуха большого и траву водяного перца по 1 вес.ч.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака матки в отвар первого

сбора добавляют 1 вес.ч. спорыньи, в отвар второго сбора - 1 вес.ч. цветков ромашки аптечной, в отвар третьего сбора - корень пиона уклоняющегося и траву подмаренника настоящего по 1 вес.ч.

5 9. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака губы, кожи, молочной железы делают дополнительно примочки из настойки мухомора красного или сока чистотела большого или свежей красной свеклы, чередуя их на протяжении 3 - 12 ч при 36-40<sup>0</sup>С.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака печени в отвар второго сбора добавляют кукурузные рыльца и цветки бессмертника песчаного по 2 вес.ч.

10 11. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лейкозе дополнительно принимают 750 мг 70-100%-ной спиртовой настойки прополиса и запивают отваром второго сбора с добавлением в него 2 вес.ч. травы медуницы неясной.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака горла в отвар второго сбора добавляют 2 вес.ч. земляничного листа.

15 13. Способ по п.1, отличающийся тем, что при лечении рака предстательной железы в отвар второго сбора добавляют 2 вес.ч. лещины при приеме отвара третьего сбора принимают 25 мл 30 - 50%-ной спиртовой настойки лещины при соотношении отвар: настойка 5:1 соответственно.

20

25

30

35

40

45

50